

## PRIMERA TAREA TEORÍA ERGÓDICA

MAURO ARTIGIANI

Los ejercicios valen todos 1 punto. La tarea se puede escribir en inglés o en español, o en una mezcla de idiomas. Se puede entregar en físico en mi buzón (H-100) o en pdf a mi correo (m.artigiani@uniandes.edu.co). La colaboración en equipos pequeños está incentivado. Cada uno tiene que entregar su tarea, escribiendo claramente con quien trabajó.

La entrega de la tarea es al **comienzo** de la clase de **viernes 30 agosto**. *Cada día de retraso causa una penalidad de 0,2 puntos en la nota.*

1. Sea  $(X, \mathcal{B}, \mu, T)$  un sistema que preserve la medida. Una sub- $\sigma$ -álgebra  $\mathcal{A} \subset \mathcal{B}$  se dice  $T$ -invariante si  $T^{-1}\mathcal{A} = \mathcal{A}$  mód  $\mu$ . Sea  $(\tilde{X}, \tilde{\mathcal{B}}, \tilde{\mu}, \tilde{T})$  definida por:
  - $\tilde{X} = \{x \in X^{\mathbb{Z}} : x_{k+1} = T(x_k) \text{ para todos } k \in \mathbb{Z}\}$ ;
  - $(\tilde{T}(x))_k = x_{k+1}$  para todos  $k \in \mathbb{Z}$  y  $x \in \tilde{X}$ ;
  - $\tilde{\mu}(\{x \in \tilde{X} : x_0 \in A\}) = \mu(A)$  para todos  $A \in \mathcal{B}$ ;
  - $\tilde{\mathcal{B}}$  es la  $\sigma$ -álgebra  $\tilde{T}$ -invariante más pequeña tale que  $\pi: x \mapsto x_0$  (de  $\tilde{X}$  a  $X$ ) sea medible.

Demuestre que  $(\tilde{X}, \tilde{\mathcal{B}}, \tilde{\mu}, \tilde{T})$  es un sistema invertible que preserva la medida y que  $\pi$  es una mapa factor. Este sistema se llama la *extensión natural* del sistema  $(X, \mathcal{B}, \mu, T)$ .

2. Sea  $(X, d)$  un espacio métrico compacto y sea  $T: X \rightarrow X$  un mapa continuo. Sea  $\mu$  una medida de probabilidad  $T$ -invariante definida sobre los conjuntos de Borel de  $X$ . Demuestre que para  $\mu$ -casi todos  $x \in X$  existe una sucesión  $n_k \rightarrow \infty$  tale que  $T^{n_k}(x) \rightarrow x$  cuando  $k \rightarrow \infty$ . Además demuestre que lo mismo todavía pasa si asumimos que  $(X, d)$  sea un espacio métrico y  $T$  es medible.
3. Definimos  $R: \mathbb{T}^2 \rightarrow \mathbb{T}^2$  como  $R(x, y) = (x + \alpha, y + \alpha)$  con  $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ . Demuestre que si  $A \times B$  es invariante, con  $A$  y  $B$  conjuntos medibles en  $\mathbb{S}^1$ ,  $A \times B$  tiene medida igual a 0 o 1. Demuestre que  $R$  no es ergódica con respecto a la medida de Lebesgue.
4. Sea  $X = \{x_1, \dots, x_r\}$  un conjunto finito. Sea  $\sigma: X \rightarrow X$  una permutación de  $X$ . La órbita de  $x_j$  bajo  $\sigma$  es el conjunto  $\{\sigma^n(x_j)\}_{n \geq 0}$ , y  $\sigma$  se dice cíclica si existe una órbita de cardinalidad  $r$ .
  - a) Dada una permutación cíclica  $\sigma$  y una función  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$  demuestre que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} f(\sigma^j x) = \frac{1}{r} (f(x_1) + \dots + f(x_r)).$$

b) Más en general, demuestre que para una permutación  $\sigma$  y una función  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$  hay

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} f(\sigma^j x) = \frac{1}{p_x} (f(x) + f(\sigma(x)) \cdots + f(\sigma^{p_x-1}(x))),$$

donde  $p_x$  es la cardinalidad de la órbita de  $x$  bajo  $\sigma$ .

5. Una semigrupo de mapas medibles  $\phi^t: X \rightarrow X$ , para  $t \in \mathbb{R}_+$  se llama un flujo. Una medida  $\mu$  es invariante bajo el flujo si es invariante para cada mapa  $\phi^t$  con  $t$  fijado. Demuestre el teorema de Birkhoff para flujos, es decir que si  $\mu$  es una medida de probabilidad invariante bajo el flujo  $\phi$  y  $f \in L^1(X, \mu)$  entonces hay que el límite

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T f(\phi^t(x)) dt$$

existe  $\mu$ -casi siempre y la función  $f^*$  definida por este límite satisface

$$\int f d\mu = \int f^* d\mu.$$

*Sugerencia: Para cada  $t$  fijado pueden aplicar el teorema de Birkhoff para el mapa  $\phi^t$ . En particular, pueden utilizar  $t = 1$ .*